

## Arbeitskalender Beeren August

*Im Spätsommer stellen die Pflegemassnahmen in Beeren hohe Anforderungen, weil gleichzeitig Kulturen in der Ernte sind und andere frisch gepflanzt werden.*

*In gefährdeten Kulturen sind Fallen zur Drosophila-Prophylaxe zu montieren und laufend zu überwachen. Bei beernteten Kulturen Bestandes-Hygiene aufrechterhalten.*

### **Erdbeeren**

- Pflanzung von Topf-Grünpflanzen im Freiland, Wasserversorgung sicherstellen
- Herbizid-Einsatz zwei Wochen nach Pflanzung, vorzugsweise Split-Behandlung
- Abgeerntete Kulturen abmähen zur Überwinterung als Zweijährige, Zwischenreihen-Bereich hacken
- Spinnmilbenbefall aufmerksam und sorgfältig kontrollieren. Bei Bedarf in Kombination mit Mehltau- und Blattfleckenbekämpfung mit Akarizid behandeln
- Akarizid-Einsatz im Spätsommer kann meistens mit weniger Zeitdruck ausgebracht werden, die Wirkung ist bis im nächsten Frühjahr zuverlässig, → weniger Mehrfachrückstände im Erntejahr!
- Späte Terminkulturen im Tunnel vor Mehлтаubefall schützen

### **Himbeeren**

- Sorgfältige Kontrolle geernteter Himbeeren auf Befall von Kirschessigfliegen (Referenz-Schale für zwei Stunden in Tiefkühler → Madenaustritt)
- Abgetragene Sommerhimbeerruten bodeneben wegschneiden, ohne Stummel
- Jungruten selektieren und aufbinden
- Weichhautmilbenbefall aufmerksam kontrollieren und bei Bedarf die Jungruten nach der Ernte behandeln

### **Heidelbeeren**

- Sorgfältige Kontrolle geernteter Heidelbeeren auf Befall von Kirschessigfliegen (Referenz-Schale für zwei Stunden in Tiefkühler → Madenaustritt)
- Sorgfältige Kontrolle geernteter Früchte auf Antraknose-Befall (weich werdende Früchte mit gelb-orange-farbenem Schleim-Austritt)
- Antraknose nach der Ernte bekämpfen (3. Behandlung)
- Schachtelhalm bekämpfen nach abgeschlossener Ernte

### **Brombeeren**

- Sorgfältige Kontrolle geernteter Brombeeren auf Befall von Kirschessigfliegen (Referenz-Schale für zwei Stunden in Tiefkühler → Madenaustritt)
- Sorgfältige Kontrolle auf Brombeermilbenbefall während der Ernte und bei Bedarf die Jungruten nach der Ernte bekämpfen mit Netzschwefel
- Abgetragene Brombeerruten bodeneben wegschneiden, ohne Stummel
- Jungruten selektieren und aufbinden, Seitentriebe auf zwanzig Zentimeter einkürzen

### **Johannis-/Stachelbeeren**

- Überalterte Leitelemente unmittelbar nach der Ernte wegschneiden, damit die verbleibenden Jungtriebe besser belichtet werden